
 <p>Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani</p> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Lodi</p>	<p>INFORMAZIONI PER L'ACCESSO ALL'AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA PEDIATRICA</p>	<p>Cod.: SI.26 Rev. 0</p>
<p>Piazza Ospitale, 10 - 26900 Lodi</p>		<p>Data: 23-03-2021 Pagina 1 di 1</p>

Descrizione della prestazione

Quando è prevista l'esecuzione di test cutanei durante la visita allergologica, il paziente deve sospendere eventuali terapie in corso con antistaminici almeno 5 giorni prima della visita e con antileucotrieni (Montelukast) il giorno precedente.

I cortisonici possono alterare i risultati del test solo se somministrati per via topica (creme) sulle braccia sede di test o se assunti per via sistemica (per bocca o per endovena) da un lungo periodo.

In caso di sospetta allergia alimentare l'esecuzione dei test cutanei con preparati standardizzati non offre garanzie di attendibilità dei risultati ottenuti. È possibile raggiungere un più alto valore prognostico predittivo positivo con la tecnica del prick by prick che consiste nell'utilizzare l'alimento fresco come allergene.

Si consiglia pertanto di portare diversi campioni dei vari alimenti sospetti, separati tra di loro, avvolti nella stagnola.

Ad esempio se si sospetta un'allergia a:

- Uovo → portare uovo intero crudo
- Frutta secca → portare un campione di ogni tipo (arachide, nocciola, noce, pistacchio, pinoli, mandorle, etc.), sgusciato e avvolto separatamente in carta stagnola
- Carne, pesce, frutta fresca o verdura → comportamento analogo alla frutta secca: il campione potrà essere crudo o cotto in relazione al sospetto anamnestico.