INFORMATIVA VACCINO ANTI-MENINGOCOCCO

Il **meningococco** è un batterio di cui si conoscono diversi tipi. La maggior parte delle malattie meningococciche nell'uomo è dovuta ai tipi A, B, C, W135 e Y: in Italia e in Europa i più diffusi sono attualmente il B e il C, mentre in Africa è prevalente il tipo A.
Il meningococco può essere responsabile di infezioni di varia gravità e colpire soggetti di tutte le età. Quasi sempre le infezioni non danno sintomi o provocano solo una leggera infiammazione delle alte vie respiratorie. In alcuni casi il meningococco si diffonde al sistema nervoso o in tutto il corpo causando così meningite o sepsi, malattie gravi che possono determinare lesioni permanenti o portare alla morte.
La trasmissione della malattia avviene tramite le goccioline di saliva.

VACCINO:
Sono disponibili al momento attuale tre tipi di vaccino:

1. un vaccino coniugato contro il solo meningococco di tipo C che può essere usato dal 3° mese di vita, ha una grande capacità di difendere dalla malattia e determina una protezione di lunga durata; è disponibile gratuitamente per tutti i bambini/ragazzi di età inferiore ai 18 anni.

2. un vaccino coniugato tetravalente contro i meningococchi di gruppo A – C – W135 – Y che può essere usato dopo i 2 anni di età e per gli adulti. E' raccomandato quando si deve intraprendere un viaggio in paesi dove questi tipi di meningococco sono presenti. E' offerto gratuitamente dagli 11 anni al compimento del 18° anno ed alle categorie a rischio per status o patologia.

3. un vaccino coniugato contro il meningococco gruppo B che contiene quattro diversi componenti della superficie dei batteri *Neisseria meningitis* gruppo B; può essere somministrato dal 3° mese di vita, per contribuire a proteggere dalla malattia causata dai batteri *Neisseria meningitis* gruppo B. Viene offerto gratuitamente per i nuovi nati dal 2017 e alle categorie a rischio per status o patologia.

Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare nella faccia antero-laterale della coscia o nel muscolo deltoide a seconda dell'età.

La vaccinazione è raccomandata, in particolare ai soggetti affetti da patologie che li espongono a maggior rischio d'infezione.

CONTROINDICAZIONI:

• reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione ad una precedente dose di vaccino o ad un suo componente.
E' opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali giudicati importanti dal medico.

EFFETTI COLLATERALI:

La vaccinazione è di solito ben tollerata. Le reazioni nella sede dell'iniezione compaiono entro 24 – 48 ore e possono essere: rossore, gonfiore, dolore. Può comparire la febbre.
Come per tutti i vaccini, non è possibile escludere l'eventualità di reazioni allergiche anche gravi come lo shock anafilattico.